

农作物病虫害情报

第十一期

(2021年8月30日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

晚稻封行期病虫害防治意见

据我中心8月23、27日到大沙、塘口、沙塘、月山和长沙等镇(街)调查,目前我市晚稻总体处于分蘖末期,部分已封行。病虫害总体属偏轻、局部中等发生,主要病虫害有稻纵卷叶螟、稻飞虱和橙叶病。

一、稻纵卷叶螟,属偏轻发生,田间虫龄以蛹为主,零星发现成蛾及卵块,预计下代卷叶螟卵盛孵高峰期为9月3-5日。调查点卷叶率如下:塘口镇宅群村1%-5%、月山镇大岗村1%-5%、月山镇朝阳村1%-5%、月山镇北二村1%-10%、沙塘镇下雨村1%-10%(以上应施药防控),大沙镇蕉园村和长沙街道办民强村<1%。

二、稻飞虱,属中等、局部偏重发生,田间以白背飞虱低龄幼虫为主。调查点百丛虫量如下:塘口镇宅群村1000头、月山镇大岗村1500头、月山镇朝阳村1000头、月山镇北二村3000头、沙塘镇下雨村1000-4000头(以上应施药防控),大沙镇蕉园村和长沙街道办民强村<1000头。

三、橙叶病，属偏轻、局部中等发生。橙叶病由电光叶蝉传播，可导致水稻枯死或不能抽穗。现部分早插植田块已出现黄叶、矮缩现象，应及时杀灭电光叶蝉，防止橙叶病爆发蔓延。

三、跗线螨，尚未发现为害。部分早稻早插植田块发生跗线螨为害，出现不能抽穗或秕谷较多现象。农户应抓好封行期和破口期防治适期，施药防治跗线螨。

四、防治意见

本次防治以稻飞虱、电光叶蝉、跗线螨为主，挑治稻纵卷叶螟，防治适期为9月3-5日。

建议农户选用持效期长、粘着性和展着性好的药剂，药剂推荐亩用量如下：

1. 防治稻纵卷叶螟使用20%氯虫苯甲酰胺10克、或10%四氯虫酰胺20克、或1.8%阿维菌素100毫升等；

2. 防治稻飞虱、电光叶蝉使用10%三氟苯嘧啶10毫升、25%噻嗪酮40克、或25%噻虫嗪4克、或25%烯啶虫胺20克、或25%吡蚜酮20克等。

3. 防治跗线螨使用虫螨净、双甲脒、三唑磷、乐斯本等。

以上药剂兑水70公斤均匀喷施，药后6小时内遇中雨以上要及时补施。

注意事项：请自觉回收农药包装废弃物，保护农业农村生态环境。